

AQVILEGIA Ackeley.

A calidam esse, ac modicè digerendi uim habere uerisimile sit

VIRES. EX RECENTIO

Recentiores omnes, tum herbarij, tum medici, Aquileg
cultates tribuunt, at quàm rectè ipsi uiderint. Neque enim
subacris non est, tantam discutiendi inesse facultatem posse
gerat & exiccet, scabiei & fistulis, potissimum si illi farina cō
ferre potest.

DE ALLIARIA. CAP. X

NOMINA.

NONDVM constat quo nomine ueteribus Græc
appellata sit. Vulgò tamen, eò quòd trita eius fo
liaceum odorem redolent, Ailiaris & Alliaria
Knoblochkraut/oder Leuchel/oder Saßtra
Pedem asininum uocat.

FORMA.

Folia eius cum primum emicant subrotunda sunt, uiola
tulum tamen maiora. Adulta autem in angulos exeunt. H
ceritate consurgit, caule tereti, foliis Vrticæ, nisi quod leuio
ta, & à pediculo latiora, Allij odoratu cum teruntur, flore la
quis semine, atro colore, radice oblonga, eiusdem cum folij

LOCVS.

B Passim propter sepes & agrorum margines prouenit.

TEMPVS.

Folia statim primo uere, atqueadeò Martio ipso erumpu
te, atque deinceps semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Quum prorsus suboleat Allium, necesse est ut tempera
sit. Calefacit igitur haudd ubiè & desiccat, non tamen perin
cessu quarto.

VIRES.

Easdem propè Allij facultates habere uel hinc conijci p
iuribus tortiuisq; succis pro Allio substituant. Proinde cō
humores in eo extenuare, glutinosos incidere potest. On
quàm Allium efficacia. Semen eius cum aceto emplast
strangulatu uteri laborantibus impositum, & ui
prodest, ac easdem excitat. Et summatim, on
Nasturtij semen, sed minori efficac
cia, potest.